# privet Prebiotic 1 kg | 1 kg




| | |
|---|---|
| **Hersteller** | priVet Farming® |
| **Artikelnummer** | 4856 |
| **Gewicht** | 1kg |
| **Länge** | 99mm |
| **Breite** | 99mm |
| **Höhe** | 222mm |

## Produktbeschreibung

***Ergänzungsfuttermittel (Pulver) für Wiederkäuer, Kälber, Schweine und Geflügel***

Ernährungsphysiologische Unterstützung der Darmflora

In einem gesunden Darm ist das Gleichgewicht der Darmflora intakt. Pathogene Bakterien finden so keine ideale Lebensgrundlage und können sich nur sehr schwer entwickeln. Da ein Großteil des Immunysystems im Darm liegt, begünstigt eine intakte Darmflora ein gut funkionierendes Immunsystem.

**privet Prebiotic** ist eine Futterergänzung mit einem speziellen Mineralkomplex, der toxinbindende Fähigkeiten besitzt. Es wurde gezielt für die besonders intensive, ernährungsphysiologische Unterstützung bei Verdauungsstörungen konzipiert. Aufgrund der Futterzusammensetzung kann es bei Mastgeflügel zu Verdauungsstörungen kommen, die sich z.B. in dünnflüssigem Kot andeuten. **privet Prebiotic** unterstützt den Darm besonders bei der Bindungskraft von Flüssigkeiten - wichtig bei Tieren, die zu Verdauungsstörungen neigen. Der Aufbau einer gesunden Darmflora ist unerlässlich für eine gesunde Jungtierentwicklung.

**Zusammensetzung:** Leinkuchen, Schwarzkümmelkuchen

**Zusatzstoffe/kg:** Technologische Zusatzstoffe: Bentonit (1m558i) 100 g.
Die Gesamtmenge an Bentonit darf den in Alleinfuttermitteln zulässigen Höchstgehalt von 20000 mg/kg Alleinfuttermittel nicht übersteigen.

**Analytische Bestandteile:** Rohprotein 15,5%, Rohfett 4,6%, Rohfaser 5,2%, Rohasche 16%, salzsäureunlösliche Asche 14%, Kalzium 0,61%, Phosphor 0,23%, Magnesium 0,38%, Natrium 0,27%, Lysin 0,59%, Methionin 0,26%

**Fütterungsempfehlung:** ***Rinder/Schweine:*** 0,5-2 g/kg Futter. ***Geflügel:*** 1 g/kg Futter. ***Kälber:*** 5-20 g/Tier in die Milch

einrühren. 1 EL entspricht ca. 3,5 g / 1 EL entspricht ca. 11 g.

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Die gleichzeitige Verabreichung von Robenidin ist zu vermeiden. Die gleichzeitige Verabreichung von Kokzidiostatika außer Robenidin ist kontraindiziert bei einer Bentonit-Menge ab 5000 mg/kg Alleinfuttermittel.

## Weitere Informationen

**PZN DE** 19680457